



**TOTALVET**

SALUD, NUTRICIÓN Y BIENESTAR ANIMAL



## CEFTIOMIC

Antibiótico Betalactámico  
de amplio espectro.



# CEFTIOMIC

## COMPOSICIÓN:

Cada 100 mL contiene:

Ceftiofur clorhidrato 5,35 g (\*)

Excipientes c.s.p. 100 mL

(\*) Equivalentes a 5 g de Ceftiofur base.

## INDICACIONES:

Antibiótico de amplio espectro (Cefalosporina de "tercera generación"), para el tratamiento y control de enfermedades producidas por gérmenes Gram ( ) y Gram (-) incluyendo cepas de bacterias productoras de beta-lactamasa, de bovinos y porcinos.

## ESPECIES:

Bovinos y Porcinos.

## PERÍODO DE CARENCIA:

Carne: 4 días porcinos; 2 días bovinos

Leche: 0 días

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Agitar bien el producto antes de usar.

Intramuscular o subcutánea en bovinos; en porcinos intramuscular profunda únicamente.

## DOSIFICACIÓN:

Bovinos: 1,1 a 2,2 mg. por kg. de peso vivo, (1 a 2 ml./50 kg. de peso) cada 24 hrs. durante 3 a 5 días consecutivos.

Porcinos: 3 a 5 mg. por kg de peso vivo, (3 a 5 ml./50 kg. de peso) cada 24 hrs. durante 3 a 5 días consecutivos.

## PRECAUCIONES:

No requiere.

## CONSERVACIÓN:

Conservaren lugar fresco y seco, protegido de la luz solar, preferentemente entre 5° y 25° C.

## PRESENTACIONES:

Balde con jeringas de 10g.

