




COLOSTRIN

Suplemento alimenticio
que contiene
immunoglobulinas.



made in Germany



SUSTITUTO LÁCTEO

Colostrin

COMPONENTES ANALÍTICOS:

30,00%	Proteína bruta	0,50%	Calcio
3,00%	Grasa bruta	0,50%	Fósforo
0,01%	Fibra bruta	0,50%	Sodio
6,50%	Ceniza bruta		

COMPOSICIÓN:

Suero en polvo, rico en proteína, glucosa, huevos en polvo

ADICTIVOS NUTRICIONALES POR KG:

150.000,0 U.I.	Vitamina A (3a672a)
40.000,0 U.I.	Vitamina D3 (3a671)
10.000,0 mg	Vitamina E/acetato de todo-rac- α -tocoferilo (3a700)
10.000,0 mg	Vitamina C (3a300)
1.000,0 mg	Hierro (quelato de hierro (II) de glicina, hidratado) (3b108)
12,5 mg	Yodo (yodato de calcio anhidro) (3b202)
5,0 mg	Selenio (selenito de sodio) (3b801)

ADICTIVOS ZOOTÉCNICO POR KG:

50,0 x 109 UFC Lactobacilo Enterococcus faecium NCIMB 10415(4b1705)

La buena conservación del producto requiere un mínimo de higiene y un almacenamiento en un lugar fresco y seco. JOSERA no tiene responsabilidad en caso de conservación inadecuada o mala utilización del producto.

USO SUGERIDO:

Este alimento tiene contenidos más altos de aditivos nutricionales que un alimento completo. Por lo tanto, sólo debe ser ofrecido a terneros menores de 6 meses en una cantidad de 100 gr por animal por día.

RECOMENDACIONES DE SUMINISTRO:

1º suministro: directamente, al menos 2 horas después del nacimiento; mezclar 100 g = 1 paquete de Colostrin con el colostro fresco.

2º suministro: al tercer día después del nacimiento; mezclar 100 g = 1 paquete de Colostrin en leche fresca o sustituto lácteo.

3º suministro: en los casos de mayor riesgo de diarrea, suministre Colostrin nuevamente después de unos días.

Forma de proceder:

Colostrin actúa según el „principio llave-cerradura“.

Los patógenos que se conectan a las inmunoglobulinas son inactivados. Esto se traduce en un sistema inmunológico más fuerte, y se ayuda a prevenir diarreas.

La „inmunización por seguridad“ cubre las deficiencias del ternero:

Fase 1: Colostrin (inmunoglobulinas en la leche diaria)

Fase 2: GoldenSpezial/Brillant (inmunoglobulinas en el sustituto lácteo)

Uso Sugerido:

Este alimento tiene contenidos más altos de aditivos nutricionales que un alimento completo. Por lo tanto, sólo debe ser ofrecido a terneros menores de 6 meses en una cantidad de 100 gr por animal por día.

PRESENTACIÓN

CAJA X 10 SOBRES



Calle Los Plateros 142,
Urb. El Artesano - ATE, LIMA - PERÚ

(511) 437-1610
www.totalvet.com.pe

