



TOTALVET

SALUD, NUTRICIÓN Y BIENESTAR ANIMAL



DIPIRONA MICROSULES

Antiinflamatorio,
Analgésico y Antipirético
no esteroideo.



DIPIRONA MICROSULES

COMPOSICIÓN:

Cada 100 ml contiene:

Dipirona 50 g

Excipientes c.s.p. 100 ml

INDICACIONES:

Es un antiinflamatorio no esteroideo, derivado pirazolonico, con acción analgésica, antipirética, antiespasmódica y antiinflamatoria.

Indicado para el tratamiento y la prevención de todos aquellos procesos agudos y crónicos que cursen con inflamación, dolor, fiebre, espasmos, cólicos, procesos osteoarticulares y musculoesqueléticos como artritis, artrosis, osteoartritis, etc., enfermedad articular degenerativa, síndrome ciático, etc.; para la prevención de inflamaciones postoperatorias, shock endotóxico, etc.

Tiene muy fuerte acción analgésica sobre las estructuras somáticas y más débil sobre las estructuras viscerales. Ejerce una acción antiespasmódica de musculatura lisa, regula los centros vegetativos, acompañado de dilatación de los vasos periféricos, mejorando la perfusión sanguínea de los músculos estriados. Tiene acción antipirética por vaso dilatación cutánea y sudoración.

ESPECIES A LAS QUE SE DESTINA:

Equinos, bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y caninos.

PERIODO DE CARENCIA:

Carne: 12 días.

No administrar en animales en lactación cuya leche se destine para consumo humano.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

Parenteral, por vía intravenosa lenta preferentemente; en caso de ser administrada por vía intramuscular debe ser profunda.

Equinos: 20 a 50 mg/kg. de peso

Bovinos: 20 a 40 mg/kg. de peso

Porcinos: 15 a 50 mg./kg. de peso

La posología quedará a criterio del profesional actuante, acorde a las necesidades del caso y el animal a tratar.

Posología sugerida:

Animales grandes: 20 a 60 ml. cada 8 a 12 hrs.

Potrillos y terneros: 5 a 15 ml. cada 8 a 12 hrs.

Ovinos y caprinos: 2 a 8 ml. cada 8 a 12 hrs.

Caninos 1 a 5 ml. cada 8 a 12 hrs.

No administrar en felinos.

PRESENTACIONES:

Frasco de vidrio por 50, 100 y 250 ml

