



TOTALVET

SALUD, NUTRICIÓN Y BIENESTAR ANIMAL



HEMOMIC FORTE

Suplemento nutricional,
vitamínico y mineral.



HEMOMIC FORTE

COMPOSICIÓN:

Proteinato de Hierro	5,70 g
Proteinato de Cobalto	0,51 g
Proteinato de Cobre	0,64 g
Proteinato de Zinc	6,40 g
Pantotenato de Calcio	0,15 g
Vitamina B1 (Tiamina HCl)	0,40 g
Vitamina B2 (Riboflavina fosfato sódica)	0,20 g
Vitamina B6 (Piridoxina HCl)	0,15 g
Vitamina B12 (Cianocobalamina)	1,90 mg
Ácido nicotínico	0,15 g
Ácido fólico	0,64 g
Vit. K3 (MBS 50%)	0,0636 g
Maltodextrina	15,00 g
Glucosa	20,00 g
Esencia manzana	1,5 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

INDICACIONES:

Suplemento de vitaminas y minerales para la alimentación animal.

Indicado para el manejo nutricional en animales en crecimiento, entrenamiento, para favorecer la performance en animales atletas y la recuperación de animales debilitados.

Las vitaminas y minerales de Hemomic Forte actúan directa e indirectamente en el metabolismo celular del animal, principalmente en las células sanguíneas, actuando como precursor de la hematopoyesis. Destinado a equinos, bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, avestruces, caninos, felinos, aves y roedores.

ADMINISTRACIÓN:

Vía oral, en el agua de bebida a la ración.

DOSIS:

Equinos adultos: Mantenimiento 20mL por día; entrenamiento leve 25mL dos veces por día; entrenamiento moderado 30 ml dos veces por día; entrenamiento intenso 35 ml dos veces por día.
Bovinos y bulbalinos adultos: 20mL por día.

Potros y terneros recién nacidos: 15 ml en el 2°, 6° y 12° día post-nacimiento.

Potros, ponys y terneros: 5 ml por día.

Ovinos, caprinos y aves de gran porte (adultos): 5 ml por día.

Ovinos, caprinos y aves de gran porte (crías): 1 ml por día.

Porcinos adultos: 2 ml por día.

Lechones: 0,5 ml por día.

Caninos y felinos: 1 gota por kg de p.v. o 1 mL cada 10 kg de p.v. cada 12 horas.

Aves y roedores: 2 gotas cada 100 mL de agua o 1 gota cada 12 horas.

PRECAUCIONES:

Mantener lejos del alcance de los niños y animales domésticos.

Nunca volver a utilizar los envases vacíos, una vez utilizados, los envases y sobrantes destruirlos en forma adecuada, de acuerdo a la normativa vigente del país para productos veterinarios.

El frío excesivo puede producir precipitación del producto, al agitar, se homogeniza rápidamente.

CONSERVACION:

Conservar en local seco y fresco, lejos de la luz solar. Temperatura de conservación entre 15 y 30°C.

PRESENTACIONES:

Frasco de 120 ml, 250 ml, 500 ml y 1 litro.

