TOTALVET

SALUD, NUTRICIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

IVERMIC 1%

Endectocida inyectable para Bovinos, ovinos, Porcinos y Camélidos.

Ficha Técnica

IVERMIC 1%

COMPOSICIÓN:

Ivermectina..... 1.0 g
Excipientes c.s.p..... 100 ml

INDICACIONES:

Ivermic 1% es un antiparasitario interno y externo para bovinos, ovinos, porcinos y camélidos sudamericanos.

Es eficaz contra garrapatas, larvas de *Dermatobia hominis* (Tupe), *Hypoderma spp. y Oestrus ovis;* piojos como *Linognathus vituli, Haematopinus spp., Solenoptes capillatus y Microthorcis cameli* y ácaros de la sarna como *Psoroptes bovis, Psoroptes ovis, Sarcoptes scabiei var. bovis y Sarcoptes scabiei var. suis.*

Ivermic 1% también ayuda en el control de parásitos internos como nemátodes gastrointestinales y pulmonares como *Haemonchus spp., Ostertagia spp.* (formas L4 inhibidas), *Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Oesophagostomum spp., Trichuris spp., Chabertia spp., Bunostomum spp., Strongyloides spp., Dictyocaulus spp., Ascaris spp., Metastrongylus spp., Camelostrongylus spp., Lamanema spp.* y *Graphinema spp.*

ADMINISTRACIÓN:

Parenteral, por inyección subcutánea.

Bovinos y Camélidos: En zonas de piel laxa, detrás o delante de la paleta.

Ovinos: En zonas de piel laxa, detrás o delante de la paleta o también en cara interna del muslo.

Porcinos: Por detrás de la oreja.

DOSIS:

Bovinos, ovinos y camélidos sudamericanos:1 ml por cada 50 Kg de peso vivo (equivalente a 200 µg de Ivermectina por Kg de peso vivo).

En caso de sarna ovina aplicar 1 ml de **Ivermic 1%** por cada 45 Kg de peso vivo, equivalente a 220 µg de Ivermectina por Kg de peso vivo, y repetir la dosis 7 días después.

En porcinos aplicar **Ivermic 1%** a razón de 1 ml cada 33 Kg de peso vivo, equivalente a 300 µg de Ivermectina por Kg de peso vivo.

PERÍODO DE RETIRO:

Bovinos: no enviar a faena animales cuya carne se destine para consumo humano hasta pasados 35 días del último tratamiento.

Ovinos: No enviar animales a faena cuya carne se destine a consumo humano hasta pasados 28 días del último tratamiento.

Porcinos: No enviar animales a faena cuya carne se destine a consumo humano hasta pasados 18 días del último tratamiento.

No usar en ganado lechero en lactación, ni 28 días antes del parto.

PRECAUCIONES:

No se aconseja la administración de **Ivermic 1%** en hembras lactantes, ni 28 días antes del parto.

CONSERVACION:

Conservar en lugar fresco, seco, ventilado y protegido de la luz solar. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No volver a utilizar los envases vacíos y destruirlos de forma adecuada.

PRESENTACIONES:

Frascos de 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml y 1 litro.

TOTALVET
SALUD, NUTRICIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

Calle Los Plateros 142,
Urb. El Artesano - ATE, LIMA - PERÚ

☎ (511) 437-1610
www.totalvet.com.pe

Elaborado por:

LABORATORIOS MICROSULES

GOOD MANUFACTURING PRACTICE GMP QUALITY PRODUCT