



IVERMIC C

Antiparasitario Interno y
Externo para Bovinos.



IVERMIC C

COMPOSICIÓN:

Ivermectina..... 1 g
Clorsulon 10 g
Excipientes c.s.p..... 100 ml

INDICACIONES:

Ivermic C inyectable está indicado en bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos para el tratamiento y control de parásitos gastrointestinales, pulmonares, fasciola hepática adulta, vermes oculares, miasis cutánea, ácaros de la sarna psoróptica y sarcóptica, piojos chupadores y berne, ura o tórsalo. Su espectro de acción incluye a:

Nematodos gastrointestinales: *Ostertagia sp.*, *Haemonchus placei*, *Mecistocirrus digitatus*, *Trichostrongylus sp.*, *Cooperia sp.*, *Oesophagostomum radiatum*, *Nematodirus helvetianus*, *N. Spathiger*, *Strongyloides papillosus*, *Bunostomum phlebotomum*, *Toxocara vitulorum*, *Trichuris spp.*;
Nematodos pulmonares: *Dictyocaulus viviparus* (adultos, L4 y estados inhibidos).

Trematodos hepáticos: *Fasciola hepática*, *Fasciola gigantica* (adultos).

Ácaros de la Sarna: *Psoroptes ovis*, *Sarcoptes scabiei var. bovis*, *Chorioptes bovis*.

Miasis: *Chrysomya bezziana*, *Cochliomyia hominivorax* (preventivo).

Piojos masticadores: *Damalinea bovis*.

Piojos chupadores: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Solenopotes capillatus*.

Berne o Ura (estados parasitarios): *Dermatobia hominis*, *Hypoderma bovis*, *H. Lineatum*.

ADMINISTRACIÓN:

Vía Subcutánea, en zonas de piel laxa, por delante o detrás de la paleta. Agitar bien antes de su administración.

DOSIS:

Bovinos, ovinos y camélidos sudamericanos: 1 mL por cada 50 kg de peso vivo, que equivalen a 200 ug/kg de Ivermectina y 2 mg de Clorsulon.

PERÍODO DE RETIRO:

Carne: 35 días.

No administrar tratamiento a las vacas en lactación, ni tampoco dentro de los 28 días antes del parto.

PRECAUCIONES:

No administrar ha ganado lechero en lactación, ni 28 días antes del parto. La administración de **Ivermic C** a temperaturas por debajo de 5° C se puede dificultar debido al aumento de la viscosidad.

CONSERVACION:

Conservar en lugar fresco, seco, ventilado y protegido de la luz solar. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No volver a utilizar los envases vacíos y destruirlos de forma adecuada.

PRESENTACIONES:

Frasco de 50ml y 250 ml.

