



MASTIMIC - S

Antibiótico de Aplicación
Intramamaria



MASTIMIC S

COMPOSICIÓN:

Cloxacilina benzatínica.....500 mg

Excipientes c.s.p..... 10 g

INDICACIONES:

Mastitis- S está indicada en bovinos para el tratamiento profiláctico de las mastitis durante el periodo de seca, principalmente aquellas causadas por gérmenes resistentes a la penicilina y sensibles a la acción de la cloxacilina benzatínica.

ADMINISTRACIÓN:

Intramamaria.

DOSIS:

Al terminar el último ordeño al final del periodo de lactación, antes del periodo de secado, administrar el contenido de un aplicador en la cisterna de cada cuarto afectado masajeando hacia arriba para favorecer la difusión del producto.

PERIODO DE RETIRO:

En carne 7 días después de finalizado el último tratamiento.

En leche 3 días después de finalizado el último tratamiento.

PRECAUCIONES:

Los animales deben ser tratados al detectarse la mastitis sub- Clínica (asintomático). Se recomienda el lavado de las ubres para facilitar la correcta distribución del producto. No realizar el tratamiento los días previos al parto para evitar la eliminación por el calostro.

CONSERVACIÓN:

Conservar en lugar fresco, seco, ventilado y protegido de la luz solar. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No volver a utilizar los envases vacíos y destruirlos de forma adecuada.

PRESENTACIONES:

Aplicadores x 10 g.

