



MICROPARAS 10%

Antiparasitario interno de Amplio
Espectro y Poder Ovicida



MICROPARAS 10%

COMPOSICIÓN:

Albendazol..... 10,0 g
Excipientes c.s.p..... 100,0 ml

INDICACIONES:

Microparas 10% es un antiparasitario oral, eficaz contra gran variedad de nemátodos gastrointestinales, nemátodos pulmonares, tenias y Fasciola Hepática que afectan a los bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos.

Entre los nemátodos gastrointestinales, elimina fases inmaduras y adultas de *Haemonchus* spp., *Ostertagia* spp. (incluso larvas hipobióticas), *Trichostrongylus* spp., *Cooperia* spp., *Nematodirus* spp., *Bunostomum* spp., *Chabertia* spp., *Oesophagostomum* spp., *Strongyloides* spp. Nemátodos pulmonares como *Dictyocaulus* spp. Tenias de céstodos como *Moniezia* spp. y fases adultas de tremátodos como *Fasciola* Hepática.

ADMINISTRACIÓN:

Microparas 10% se administra vía oral. Agitar bien el producto antes de dosificar y periódicamente durante la aplicación.

DOSIS:

En bovinos y camélidos sudamericanos administrar vía oral, 1 ml de Microparas 10% para cada 20 Kg de peso vivo, equivalente a 5 mg/Kg peso vivo, para nemátodos gastrointestinales, nemátodos pulmonares y céstodos (tenias).

En ovinos y caprinos aplicar 1 ml cada 26 Kg de peso vivo, equivalente a 3,8 mg/Kg peso vivo contra nemátodos gastrointestinales, nemátodos pulmonares y céstodos (tenias).

Para tratamientos contra *Fasciola* Hepática adulta se deberá duplicar la dosis, aplicando 1 ml de Microparas 10% para cada 10 Kg de peso vivo en bovinos y camélidos sudamericanos (10 mg/Kg peso vivo) y 1 ml de Microparas 10% para cada 13 kg de peso vivo en ovinos y caprinos.

Para el tratamiento de nemátodos gastrointestinales y *Fasciola* Hepática se recomienda dosificar antes y después de las temporadas de lluvias. Para el tratamiento de tenias y parásitos pulmonares dosificar de acuerdo a incidencia.

PERIODO DE RETIRO:

En carne de bovinos 14 días, en carne de ovinos 10 días y en leche 3 días después de la última dosificación.

RECAUCIONES:

No administrar en hembras durante los primeros 45 días de gestación.

CONSERVACIÓN:

Conservar en lugar fresco, seco, ventilado y protegido de la luz solar. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No volver a utilizar los envases vacíos y destruirlos de forma adecuada.

PRESENTACIONES:

Frascos de 250 ml y 1 litro.

