



TOTALVET

SALUD, NUTRICIÓN Y BIENESTAR ANIMAL



NITROMIC IVER

Endectocida, Fasciolicida,
Nematodocida y Oestricida



NITROMIC IVER

COMPOSICIÓN:

Nitroxinil.....34 g
Ivermectina.....1 g
Excipientes c.s.p..... 100 mL

INDICACIONES:

Indicado en bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos para el tratamiento y control de parásitos gastrointestinales, pulmonares, fasciola hepática y para sitios externos. Fasciola hepática (a partir de 8 semanas).

Su espectro de acción incluye a **Nematodos gastrointestinales**: *Ostertagia* sp., *Haemonchus placei*, *Mecistocirrus digitatus*, *Trichostrongylus* sp., *Cooperia* sp., *Oesophagostomum radiatum*, *Nematodirus helvetianus*, *N. Spathiger*, *Strongyloides papillosus*, *Bunostomum phlebotomum*, *Toxocara vitulorum*, *Trichuris* spp.; **Nematodos pulmonares**: *Dictyocaulus viviparus* (adultos, L4 y estados inhibidos).

Trematodes hepáticos: *Fasciola hepática*, *Fasciola gigantica* (adultos).

Ácaros de la Sarna: *Psoroptes bovis*, *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*, *Chorioptes bovis*. “no se recomienda su uso contra sarna ovina”.

Miasis: *Chrysomya bezziana*, *Cochliomyia hominivorax* (preventivo)

Piojos masticadores: *Damalinea bovis*

Piojos chupadores: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Solenopotes capillatus*.

Berne o Ura (estados parasitarios): *Dermatobia hominis*, *Hypoderma bovis*, *H. Lineatum*.

ADMINISTRACIÓN:

Vía Subcutánea, en zonas de piel laxa, por delante o detrás de la paleta. Agitar bien antes de su administración.

DOSIS:

Bovinos, ovinos y camélidos sudamericanos: 1 mL por cada 50 kg de peso vivo, que equivalen a 6.8 mg/kg de Nitroxinil y 200 mcg/kg de Ivermectina.

PERIODO DE RETIRO:

Carne 60 días.

RECAUCIONES:

No administrar a ganado lechero en lactación cuya leche se destine al consumo humano, ni 28 días antes del parto.

CONSERVACIÓN:

Conservar en lugar fresco, seco, ventilado y protegido de la luz solar. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No volver a utilizar los envases vacíos y destruirlos de forma adecuada.

PRESENTACIONES:

Frasco de 20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml y 1 L.

