



OXIMIC 30% FM

Antibiótico de amplio
espectro y larga acción-
Antiinflamatorio.



OXIMIC 30% FM

COMPOSICIÓN:

Cada 100 ml contiene:

Oxitetraciclina dihidrato (*) 32,4 g

Flunixinina meglumina (**) 3,3 g

Excipientes c.s.p. 100,0 ml

(*) equivalente a 30 g de Oxitetraciclina

(**) equivalente a 2 g de Flunixinina base

INDICACIONES:

Asociación sinérgica de un antibiótico de amplio espectro de larga acción (OXITETRACICLINA L.A.) y un antiinflamatorio no esteroideo (FLUNIXINA), analgésico y antipirético con efecto antiendotóxico por 24 a 36 hrs., para optimizar el tratamiento en una sola aplicación.

Oxitetraciclina: promueve acción prolongada y sostenida en el control y tratamiento de cuadros infecciosos del sistema respiratorio, urinario e infecciones locales causadas por gérmenes Gram, Gram -.

Flunixinina- Infecciones donde un efecto antiinflamatorio, antipirético y antiendotóxico es requerido. Tratamiento de inflamación del aparato locomotor y músculo-esquelético. En cuadros inflamatorios asociados al "Complejo Respiratorio Bovino" por su acción antipirética. Diarreas neonatales, "vaca caída" y tratamiento de mastitis agudas.

ESPECIES:

Bovinos, camélidos y auquénidos sudamericanos (Llamas, Alpacas, etc).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Se administra por vía parenteral, intramuscular profunda, preferentemente en la región del cuello (tabla del cuello). No administrar más de 10 ml por punto de inoculación.

DOSIS:

Posología sugerida: 10 ml. cada 100 kg. p.v. (equivalentes a 30 mg/kg de p.v. de oxitetraciclina y a 2 mg/kg de p.v. de flunixinina).

Dosis: 10 ml cada 150 Kg p.v. para infecciones leves; 10 ml cada 100 kg. p.v. para infecciones moderadas a severas.

El intervalo puede variar acorde a las necesidades de cada caso y/o a criterio del profesional actuante.

PERÍODO DE CARENIA Y PRECAUCIONES:

No administrar a hembras en producción láctea cuya leche se destine para consumo humano.

No enviar los animales a faena cuya carne se destine para consumo humano hasta transcurridos: * dosis de 20 mg/kg. p.v. = hasta transcurridos 28 días del último tratamiento. * dosis de 30 mg/kg. pv. = hasta transcurridos 35 días del último tratamiento.

CONSERVACIÓN:

Conservaren lugar fresco y seco, protegido de la luz solar, preferentemente entre 5° y 25° C.

PRESENTACIONES:

Frasco por 100 ml.

