



BIOLÓGICO

VAC-SULES MULTICLOSTRI (7-1)

Vacuna para la prevención de
Gangrena Gaseosa, Edema
Maligno, Hepatitis Necrótica
Infecciosa, Hemoglobinuria
Bacilar.



VAC-SULES MULTICLOSTRI (7-1)

INDICACIONES:

Vacuna para la prevención de Gangrena Gaseosa, Edema Maligno, Hepatitis Necrótica Infecciosa, Hemoglobinuria Bacilar, Enfermedad del Riñón Pulposo, Muerte Súbita, Pierna Negra o Carunco Sintomático.

COMPOSICIÓN:

Vacuna que consiste en toxoides purificados y concentrados de:

<i>Clostridium perfringens C</i>	20 000.0 DLM 50%
<i>Clostridium perfringens D</i>	75 000.00 DLM 50%
<i>Clostridium novyi B</i>	17 500.0 DLM 50%
<i>Clostridium novyi D</i>	20 % v/v
<i>Clostridium chauvoei</i>	10 % v/v
<i>Clostridium septicum</i>	15 000.0 DLM 50%
<i>Clostridium sordelli</i>	18 7500.0 DLM 50%

ESPECIES:

Bovinos, Ovinos, Caprinos y Camélidos

APLICACIÓN Y DOSIS:

Aplicar por vía subcutánea.

- Bovinos: 5 mL.
- Ovinos, Caprinos y Camélidos: 3 mL.

Para hembras gestantes: último tercio de gestación.

CALENDARIO DE VACUNACIÓN:

Animales que no hayan sido previamente inmunizados se les debe administrar 2 inyecciones con un intervalo de 28 - 30 días (primera vacuna y refuerzo). Posteriormente se llevará a cabo una revacunación anual, la cual es importante para logra una inmunidad duradera.

Los corderos deben ser vacunados a partir de los 4 meses de edad y los terneros a los 6 meses, ambos revacunados a los 28-30 días y luego anualmente.

PRECAUCIONES:

- Manténgase en refrigeración a temperatura entre 2°C y 8°C.
- No congelar.
- Aplique en animales sanos.
- Agite bien antes y durante su uso.
- No se exponga a los rayos directos del sol por tiempo prolongado.
- Conserve la cadena de frío

CONTRAINDICACIONES:

Algunos animales pueden desarrollar una reacción inflamatoria en el punto de inoculación. Un moderado incremento en la temperatura puede seguir a la vacunación. Podrían aparecer reacciones de hipersensibilidad excepcionalmente en algunos animales después de la vacunación; en tales casos tratar inmediatamente con adrenalina o antihistamínicos.

PERIODO DE RETIRO:

Se sugiere que los animales destinados al consumo humano no deben ser sacrificados hasta pasadas las 3 - 4 semanas posteriores a la vacunación.

RECOMENDACIONES:

- Se deben vacunar animales en buen estado sanitario, peso acorde a la edad como demostración de buen estado nutricional, evitar stress del transporte y dejar descansar del rodeo el día postvacunación.
- No se debe romper en ningún momento la cadena de frío hasta su utilización (2°C - 8°C).
- Considerando que el producto es una vacuna, su acción es inminentemente preventiva y no curativa.
- A efectos de mantener una higiene adecuada, es deseable cambiar las agujas de vacunación con la frecuencia máxima posible.

PRESENTACIONES:

Frascos por 50ml, 100ml y 250ml.

PERIODO DE VALIDEZ:

La validez del inmunobiológico es de 2 años (24 meses) a partir de la fecha de su elaboración.

