



VAC-SULES REPRODUCTIVA FORTE

Vacuna combinada
doble emulsión.



VAC-SULES

REPRODUCTIVA FORTE

COMPOSICIÓN:

- Virus de la Rinotraqueítis Infecciosa Bovina tipo 1 (IBR) 1×10^7 DICT50 % / ml
- Virus de la Rinotraqueítis Infecciosa Bovina tipo 5 (IBR) 1×10^7 DICT50 % / ml
- Virus de la Diarrea Viral Bovina tipo 1 (BVD) 1×10^5 DICT50 % / ml
- Virus de la Diarrea Viral Bovina tipo 2 (BVD) 1×10^5 DICT50 % / ml
- Leptospira Icterohaemorrhagiae 1×10^7 UFC/ml
- Leptospira Canicola 1×10^7 UFC/ml
- Leptospira Copenhageni 1×10^7 UFC/ml
- Leptospira Pomona 1×10^7 UFC/ml
- Leptospira Wolffi 1×10^7 UFC/ml
- Leptospira Grippotyphosa 1×10^7 UFC/ml
- Leptospira Tarassovi 1×10^7 UFC/ml
- Leptospira Hardjo 1×10^7 UFC/ml
- Leptospira Pyrogenes 1×10^7 UFC/ml
- Leptospira Bataviae 1×10^7 UFC/ml
- Leptospira Hardjo bovis 1×10^7 UFC/ml
- Campylobacter fetus subespecie fetus 40 mg / dosis
- Campylobacter fetus subespecie venerealis 40 mg / dosis
- Campylobacter fetus subespecie venerealis biotipo intermedius 40 mg / dosis
- Haemophilus somnus 1×10^7 UFC/ml

Excipientes:

Adyuvante oleoso en doble emulsión 1,5 ml / dosis
Timerosal 1/10.000

INDICACIONES:

Inmulobioógico para la prevención de la Rinotraqueítis infecciosa Bovina (IBR), Diarrea Viral Bovina (DVB), Leptospirosis, Camplio bacteriosis y Hemofilosis en bovinos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía subcutánea.

ESPECIES:

Bovinos.

PERÍODO DE CARENIA:

No sacrificar a los animales para consumo humano antes de los 45-60 días post-vacunación.

DOSIFICACIÓN:

Bovinos: 5 ml

Vacunar y revacunar en un intervalo de 20-25 días, y revacunar con una sola dosis en forma anual.

Se puede vacunar a partir de los 3 meses de edad,

Se puede utilizar en hembras preñadas.

CONSERVACIÓN:

Conservar entre 2°C-8°C.

NO CONGELAR.



Calle Los Plateros 142,
Urb. El Artesano - ATE, LIMA - PERÚ

☎ (511) 437-1610
www.totalvet.com.pe
www.totalvet.com.pe

Elaborado por:

